

---



---

## مقاله تحقیقاتی

---

# رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب نظامی

فاطمه کلروزی<sup>۱</sup>، سید امیر حسین پیشگویی<sup>۲</sup>، اسماعیل طاهریان<sup>۳</sup>، سامان خیاط<sup>۴</sup>، راضیه فراز<sup>۵</sup>

### چکیده

**مقدمه:** رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین‌کننده سلامت بشری و راهی بهمنظور رسیدن به کیفیت زندگی بهتر است. هدف این پژوهش، تعیین وضعیت انجام رفتارهای ارتقاده‌نده سلامت در پرستاران بود.

**مواد و روش‌ها:** این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی بود و بر روی ۴۰۰ پرستار شاغل در بخش‌های بیمارستان‌های آجا واقع در شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای با کمک پرسشنامه بین‌المللی رفتارهای ارتقاده‌نده سلامت انجام شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS ۲۱ و روش‌های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.

**یافته‌ها:** ۹۳/۸ درصد واحداً سیگار مصرف نمی‌کردند. میانگین نمره سلامتی پرستاران با سن بالاتر از ۴۵ سال ۱۱۳/۲±۲/۴۱ بود که کمترین نمره سلامتی در بین گروه‌های سنی بود. همچنین واحداً دارای شاخص توده بدنی با میانگین ۲۴/۴۸±۴/۱ بودند. ۸۰ درصد ایشان حداقل سالی یک بار از وضعیت سلامتی خود آگاه می‌شدند. بالاترین درصد بیماری گزارش شده (۱۹/۵ درصد) متعلق به گروه اختلالات اسکلتی - عضلانی بود. کمترین نمره میانگین کسب شده در حیطه فعالیت فیزیکی بود. آزمون آنوازاً بین نمرات سلامتی افراد سیگاری و غیر سیگاری نشان داد. درنهایت میانگین نیز آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین نمرات سلامتی افراد سیگاری و غیر سیگاری نشان داد. درنهایت میانگین نمره کل پرسشنامه سلامتی ۱۳۳/۷۹±۱۸/۵۵ به دست آمد. آزمون آنوازاً تفاوت معنی‌داری را در میانگین نمرات رفتارهای ارتقاده‌نده سلامت و حیطه‌های آن بر حسب دو متغیر مدرک تحصیلی و نوع بخش نشان نداد.

**بحث و نتیجه‌گیری:** میانگین نمره کل رفتارهای ارتقاده‌نده سلامت در پرستاران پژوهش حاضر نشان‌دهنده قرارگیری ایشان در سطح قابل قبول می‌باشد. لزوم اجرای برنامه‌های آموزش سلامت با تأکید بر فعالیت فیزیکی در بین ایشان ضروری می‌باشد.

**کلمات کلیدی:** رفتار ارتقاده‌نده سلامتی، پرستاران، سلامت

مجله علوم مراقبتی نظامی ■ سال اول ■ شماره ۲ ■ زمستان ۱۳۹۳ ■ شماره مسلسل ۲ ■ صفحات ۸۰-۷۳

### مقدمه

که سلامت افراد نقش بسیار مهمی در ساختار بهداشتی و سلامتی جامعه دارد (۱). به عبارت دیگر، سلامت نیاز اولیه بشری و اساس کار کرد موفق افراد و جوامع است. بر همین اساس، تمام کشورهای دنیا بر اساس منشور اتاوا (Ottawa) که در سال ۱۹۸۶ به تصویب

پارادایم جدید سلامت اشاره به این دارد که سالم بودن، وابسته به عوامل متعددی است مانند عوامل اجتماعی، میزان آگاهی و حتی ویژگی‌های شخصیتی. دلیل تأکید زیاد بر این فاکتورها، این است

۱- مریم، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه کودکان  
۲- استادیار، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، گروه داخلی- جراحی (نویسنده مسئول)

آدرس الکترونیک: apishgooy@yahoo.com

۳- دانشجوی کارشناسی پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری

۴- دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پیراپزشکی

۵- کارشناس پرستاری، ایران، شیراز، بیمارستان ۵۷۶ ارش

سبک زندگی فردی و اجتماعی است، مانند رژیم غذایی نامناسب، بی تحرکی، کمبود فعالیت بدنی و مصرف سیگار که از عوامل اصلی بروز بیماری های خطرناکی مثل بیماری های قلبی، فشارخون بالا، چاقی، دیابت، سکته مغزی و سرطان می باشند و کنترل این عوامل خطرآفرین سبب کاهش حدود ۵۰ درصد مرگ و میر های شود (۱۰). پرستاران در بین اعضای تیم بهداشت و درمان دارای جایگاه ویژه ای می باشند و نقش های متعددی مانند مراقبت بالینی، مشاوره و پیگیری اجرای صحیح درمان، آموزش بیماران و آموزش روش های پیشگیری از بیماری در ایشان را بر عهده دارند، آن ها در قبال بیمار به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول اند و تحقق این امر نه تنها از طریق علمی، روش های اخلاقی صحیح و برقراری ارتباط با مددجو بلکه از طریق سلامتی خود پرستار قابل دسترسی است و ایجاب می کند که پرستار از توانایی و سلامت جسمی کافی برخوردار باشد (۱۱، ۱۲). ولی آمارها نشان می دهد خود این پرستاران از سطح سلامت پایین تری نسبت به سایر مشاغل درمانی برخوردارند و ۴/۲ درصد بیشتر از پزشکان در معرض آسیب های سلامتی هستند (۱۳). البته شاید دلیل آن، کار سخت تر پرستاران از نظر فیزیکی باشد چنانچه تحقیقات نشان داده ۷۰ درصد حجم کاری نظام بهداشتی - درمانی بر عهده پرستاران است و شرایط و موقعیت های بسیار حساس که آنان در حین انجام وظیفه با آن رو برو می شوند بر روی سلامت جسمی و روحی آنان تأثیر می گذارد، ولی بررسی ها نشان می دهد به عنوان مثال، مصرف نمک و نداشتن تحرک بدنی کافی و یا بهداشت روانی پایین در پرستاران شیوع بیشتری دارد، از طرف دیگر افزایش هزینه سلامتی به همراه این مطلب که مراقبت از بیماری همواره مؤثر نمی باشد، حمایت از مفهوم ارتقاء سلامت و ترویج آن را بین کارکنان مراقبت سلامت و بهویژه پرستاران افزایش داده است و پرستاران نمی توانند نیازهای مددجویان را برآورده سازند مگر آنکه توجه زیادی به شیوه های ارتقاء دهنده زندگی و سلامتی خود مبذول دارند (۷، ۱۱، ۱۴). جهت بهبود کیفیت مراقبت پرستاری و ارتقاء سطح سلامت جامعه، توجه و برنامه ریزی جهت پیشگیری از این مشکلات ضروری می باشد که به طور جامع و هدفمند، برنامه ای در مورد آن اجرا شده، لذا با توجه به اینکه یکی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان به خصوص سازمان های نظامی، نیروی انسانی می باشد و سلامت نیروهای

رسید، ملزم شدند در جهت ارتقاء سلامت مردم جامعه خود بکوشند، آنچه در این منشور تأکید می شود آن است که سلامتی موضوعی مشترک در تمام کشورها و فرهنگ های باشد و سازمان های بهداشتی و درمانی در کشورها، در جهت دستیابی به آن تلاش کند (۲). امروزه در تمام دنیا به جای آنکه تنها تمرکز بر استراتژی های درمانی داشته باشند، سعی دارند با برنامه ریزی و آموزش به مردم جامعه، سلامت را گسترش دهند، تحقیقات نشان داده که علت بسیاری از این مشکلات، سبک زندگی و نوع رفتارهای بهداشتی مردم است و انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از بهترین راه هایی است که مردم با کمک آن می توانند سلامتی خود را حفظ و کنترل نمایند (۱، ۴). رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عملده تعیین کننده سلامت می باشد و انجام این رفتارها به کیفیت زندگی مثبت کمک می کند (۵). این رفتارها از نظر پندر (Pender) هرگونه اقدامی است که برای افزایش و یا نگهداری سطح سلامتی و خود شکوفایی فرد یا گروه صورت می گیرد. از نظر پندر رفتار ارتقاده نده سلامت بیان کننده تمایل انسان به تعالی است که منجر به بهزیستی مطلوب (Optimal-well being)، تکامل فردی و زندگی خلاق می گردد و مدلی چند بعدی از اعمال داوطلبانه و ادراکی است که به حفظ و بالا بردن سطح سلامت، خودشکوفایی و موفقیت می انجامد (۶، ۷) هم چنین از دیدگاه واکر (walker)، شیوه ارتقا سلامت الگوی چند بعدی از خودکارآمدی، حفظ و یا ارتقاء سطح رفاه و خود شکوفایی کامل اشخاص می باشد و از این راه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و رفاه روانی، اجتماعی اشخاص از تعیین کننده های مهم وضعیت سلامتی هستند (۸).

در مورد اهمیت رعایت این رفتارها همین بس که تحقیقات ثابت کرده اند، ۷۰ درصد بیماری ها به گونه ای با سبک زندگی فرد در ارتباط است، به نحوی که اختلالات قلبی - ریوی و سیستم حرکتی و عضلانی و سایر بیماری های انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم از شیوه زندگی فرد ناشی می شود و تحت تأثیر آن می باشد (۹). نقش رفتارهای بهداشتی نظیر ورزش و تغذیه مناسب و یا داشتن رفتارهای اجتماعی مناسب در کاهش میزان ابتلا به بیماری ها و مrog و Mیر ناشی از آن به اثبات رسیده است، به علاوه ۱/۵ درصد کل مرگ و میرها به دلیل شیوع و رواج چند رفتار تهدید کننده سلامت روی می دهد که تقریباً همه آن ها ناشی از نادرست بودن

۵۲-۲۰۸ است و نمره بیشتر، به معنی وضعیت سلامتی بهتر بود. به این ترتیب که با دریافت ۹۷ درصد نمره و بالاتر یعنی ۷۵-۹۷ ۲۰۱/۷۸ امتیاز جزء دسته‌بندی خوب، دریافت ۷۵-۹۷ درصد یعنی ۱۵۰/۷-۲۰۱ امتیاز جزء دسته‌بندی قابل قبول و کمتر از این مقدار جزء دسته‌بندی ضعیف قرار می‌گرفت. این پرسشنامه در ایران و در پژوهش‌های متعدد در سراسر جهان به کار گرفته شده و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و حیطه‌های آن ۰/۹۴-۰/۷۴ گزارش شده است (۱۰، ۱۵).

پژوهشگر پس از اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، پرسشنامه‌ها را با ارائه اطلاعات لازم در خصوص تحقیق و اخذ رضایت‌نامه شرکت در پژوهش و اطمینان دادن از محروم‌نامه ماندن اطلاعات در اختیار شرکت‌کنندگان قراردادند. به این صورت که با هماهنگی مسئولین بیمارستان‌های منتخب نظامی واقع در شهر تهران، بعد از ریختن اسمی بخش‌ها داخل کیسه و قرعه‌کشی از هر کدام از بخش‌های اورژانس، دیالیز، داخلی-جراحی، ICU، CCU، بخش مورد بررسی انتخاب می‌شد؛ یعنی اگر بیمارستانی سه بخش داخلی داشت به قید قرعه یکی از آن‌ها انتخاب و وارد نمونه‌گیری می‌گردید. پرستاران مورد پژوهش در هر بخش نیز با همین روش یعنی قرعه‌کشی اسمی و به طور تصادفی وارد تحقیق گردیدند. پرسشنامه توسط محقق به نمونه‌ها تحویل داده و با هماهنگی ایشان همان روز یا روز بعد تحویل گرفته شد. اگر تعداد نمونه به ۴۰۰ نفر نمی‌رسید مجدداً بخش‌ها و پرستاران جدید با همین روش، وارد نمونه‌گیری می‌شدند. پرسشنامه به پرسنل هر سه شیفت داده شد. کل زمان نمونه‌گیری یک ماه به طول انجامید. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ و روش‌های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### یافته‌ها

بیش از نیمی از پرستاران شرکت‌کننده در مطالعه (۵۵/۵ درصد) زن، ۶۶/۵ درصد متاهل و میانگین سنی آن‌ها  $30/8 \pm 8/1$  سال بود. ۷۳/۵ درصد واحدهای مورد پژوهش دارای مدرک لیسانس و ۳۹/۵ درصد ایشان در بخش‌های داخلی-جراحی و ۳۳ درصد در شیفت صبح مشغول به کار بودند. میانگین سابقه کاری پرستاران مورد پژوهش  $13/72 \pm 8$  سال بود. ۹۳/۸ درصد سیگار مصرف

نظامی، تقویت بنیه دفاعی کشور است و با توجه به اینکه تاکنون هیچ پژوهشی بر روی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های نظامی صورت نگرفته، پژوهش حاضر طراحی و اجرا گردید. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در افزایش آگاهی سازمانی به ویژه در پرستاران و مدیران بیمارستان‌ها در خصوص ارائه برنامه‌های ارتقاء دهنده سلامت برای پرستاران و افزایش سلامتی آنان مؤثر باشد.

### مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی مقطعی بوده و بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آجاقع در شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انجام گردید. حجم نمونه با اطمینان ۹۵ درصد و واریانس ۰/۰۵ و با کمک فرمول تعیین حجم نمونه ۴۰۰ نفر برآورد شد.

این پرستاران، شاغل در بخش‌های ویژه (CCU, ICU)، اتاق عمل، اورژانس و داخلی - جراحی بوده و تمایل به شرکت در پژوهش داشتند. در این مطالعه از پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد. قسمت اول مربوط به کسب اطلاعات دموگرافیک واحدها و شامل ۶ سؤال در مورد سن، جنس، وضعیت تأهل، نوع بخش، نوبت کاری و شاخص توده بدنی (BMI) و قسمت دوم، پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت Profile-II (Health Promotion Life style HPLP-II) بود. این پرسشنامه حاوی ۵۲ سؤال بود که پاسخ‌گو بعد از خواندن هر سؤال یکی از چهار گزینه هرگز، گاهی اوقات، اغلب و عموماً را انتخاب می‌کرد. سؤال‌های این پرسشنامه در ۶ حیطه طبقه‌بندی شده است که شامل مسئولیت‌پذیری (پذیرش مسئولیت سلامت خود، ۱۲ سؤال)، فعالیت فیزیکی (اندازه‌گیری الگوهای منظم انجام ورزش و تمرینات بدنی، ۷ سؤال)، تعذیبه (ارزیابی الگوهای غذایی و انتخاب‌های تعذیبه‌ای، ۹ سؤال)، رشد معنی (ارزیابی میزان رشد معنی، ۱۱ سؤال)، مدیریت استرس (اندازه‌گیری توانایی مقابله با استرس، ۸ سؤال) و روابط بین فردی (مشخص کننده احساس صمیمیت و ارتباط نزدیک، ۵ سؤال) بود. هر سؤال ۴ پاسخ داشت که به صورت هرگز ۱ امتیاز، گاهی اوقات ۲ امتیاز، معمولاً ۳ امتیاز و همیشه ۴ امتیاز نمره دهی شده است. محدوده نمره کل پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بین

نمی کردند و در گروه مصرف کنندگان سیگار، میانگین مصرف آنها روزانه  $0.38 \pm 0.03$  نخ بود. میانگین نمره سلامتی پرستاران با سن بالاتر از ۴۵ سال  $113.2 \pm 2.41$  بود که کمترین نمره سلامتی در بین گروههای سنی واحدهای مورد پژوهش بود. همچنین (Body Mass Index) BMI پرستاران دارای شاخص توده بدنی (Body Mass Index) BMI با میانگین  $24.48 \pm 4.1$  بودند.  $80$  درصد ایشان حداقل سالی یکبار با مراجعه به پزشک از وضعیت سلامتی خودآگاه می شدند و آن را کنترل می کردند.  $64.5$  درصد پرستاران بیماری مزمن نداشتند ولی از بین بیماری های گزارش شده توسط آنها بالاترین درصد  $19.5$  درصد) متعلق به گروه اختلالات اسکلتی-عضلانی، کمردرد و پادرد بود (جدول ۱). به منظور تعیین ارتباط میزان سلامتی با جنس از آزمون تی مستقل استفاده شد و نتیجه نشان داد اختلاف نمرات بین مردان و زنان معنادار بوده وزنان از میانگین نمره سلامتی بالاتری برخوردار بودند ( $t = 3.509$ ,  $p = 0.000$ ). (Asy mp = ۰/۰۰۰)

آزمون آماری آنوا اختلاف معناداری را بین سلامت پرستاران موردن پژوهش از نظر بخش محل کار خود نشان نداد ( $F = 0.41$ ,  $p = 0.74$ ). همچنین نتایج نشان داد بین شیفت های مختلف از نظر سلامتی اختلاف نمره وجود دارد ( $F = 3.64$ ,  $p = 0.02$ ). همچنین متغیر شیفت شب-صبح کار ( $df = 6$ )؛ و نیز مشخص شد پرستارانی که در شیفت شب-صبح کار می کردند کمترین نمره سلامتی و شیفت ثابت صبح بالاترین نمره را دریافت نموده اند. همچنین آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین نمرات سلامتی افراد سیگاری و غیر سیگاری نشان داد، به این معنی که افراد غیر سیگاری نمره بالاتری داشتند ( $t = 0.000$ ,  $p = 0.000$ ). درنهایت میانگین نمره کل پرسشنامه سلامتی واحدهای موردن پژوهش  $133.7 / 79$  به دست آمد که نشان دهنده آن است که واحدهای موردن پژوهش در دسته بندی قابل قبول قرار می گیرند (جدول ۳).

جدول ۳- میانگین و انحراف معیار نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت به صورت کلی

متغیر	انحراف معنی داری	معیار میانگین (آزمون تی مستقل)
مسئولیت پذیری سلامتی	$32.36 \pm 6.25$	$0.000$
فعالیت فیزیکی	$13.88 \pm 4.53$	$0.46$
تجذیه	$23.07 \pm 4.94$	$0.001$
رشد معنوی	$32.36 \pm 6.29$	$0.520$
روابط بین فردی	$15.11 \pm 2.84$	$0.000$
مدیریت استرس	$20.89 \pm 4.60$	$0.025$

نمی کردند و در گروه مصرف کنندگان سیگار، میانگین مصرف آنها روزانه  $0.38 \pm 0.03$  نخ بود. میانگین نمره سلامتی پرستاران با سن بالاتر از ۴۵ سال  $113.2 \pm 2.41$  بود که کمترین نمره سلامتی در بین گروههای سنی واحدهای مورد پژوهش بود. همچنین (Body Mass Index) BMI پرستاران دارای شاخص توده بدنی (Body Mass Index) BMI با میانگین  $24.48 \pm 4.1$  بودند.  $80$  درصد ایشان حداقل سالی یکبار با مراجعه به پزشک از وضعیت سلامتی خودآگاه می شدند و آن را کنترل می کردند.  $64.5$  درصد پرستاران بیماری مزمن نداشتند ولی از بین بیماری های گزارش شده توسط آنها بالاترین درصد  $19.5$  درصد) متعلق به گروه اختلالات اسکلتی-عضلانی، کمردرد و پادرد بود (جدول ۱). به منظور تعیین ارتباط میزان سلامتی با جنس از آزمون تی مستقل استفاده شد و نتیجه نشان داد اختلاف نمرات بین مردان و زنان معنادار بوده وزنان از میانگین نمره سلامتی بالاتری برخوردار بودند ( $t = 3.509$ ,  $p = 0.000$ ).

جدول ۱- توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای پژوهش بر حسب وجود بیماری های مزمن

بیماری های مزمن	فراروانی	تعداد درصد	تعداد
بدون بیماری			$258 / 64$
فشار خون بالا			$15 / 8.3$
دیابت			$12 / 3$
چربی خون بالا			$11 / 8.2$
بیماری قلبی			$7 / 8.1$
بیماری تنفسی			$8 / 2$
اختلالات اسکلتی-عضلانی			$78 / 19.5$
ترکیب بیماری های بالا			$11 / 8.2$
جمع			$400 / 100$

جدول بالا نشانگر آن است که بین انواع بیماری های مزمن، اختلالات اسکلتی-عضلانی بیشترین درصد شیوع را به خود اختصاص داده است ( $19.5$  درصد)

جدول ۲- میانگین و پراکندگی نمره سلامت کسب شده از پرسشنامه در واحدهای مورد پژوهش

جنس	میانگین	انحراف معیار	تعداد
زن	$137.0 / 20.23$	$221$	$137.0 / 20.23$
مرد	$129.65 / 21.70$	$175$	$129.65 / 21.70$

آزمون T مستقل اختلاف معناداری را بین نمرات مردان وزنان نشان داد به این ترتیب که زنان از میانگین نمره بالاتری برخوردارند و سالم تر می باشند ( $df = 394$ ,  $t = 3.5 / 2$ ,  $P = 0.02$ )

## بحث

و روحی در فرد می‌شود (۱۴، ۲۰، ۲۱).

در این تحقیق مشخص شد بخش محل کار پرستاران با نمره سلامتی ایشان تفاوت معناداری ندارد، هرچند که نتیجه پژوهش درویش پور کاخکی این نتیجه را تائید نمی‌کند ولی پژوهش بسر (Besar) و کیراگ (Kirag) با پژوهش حاضر هم‌راستا است. عموماً انتظار می‌رود پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و ویژه به دلیل برخورد بیشتر با عوامل تهدیدکننده سلامتی بیشتر در معرض آسیب‌های جسمانی باشند (۲۰، ۲۱). اما عوامل تهدیدکننده سلامتی در این بخش‌ها متفاوت است. تنوع کاری، برخورد کوتاه‌مدت با بیماران، احساس استقلال عمل و درآمد بیشتر می‌تواند توجیه کننده سلامتی بهتر پرستاران این بخش‌ها نسبت به پرستاران شاغل در سایر بخش‌ها باشد (۲۲).

نتایج بیانگر آن است که پرستاران صبح کار از نمره سلامتی بالاتری برخوردارند ولی شیفت شب-صبح کمترین نمره را دریافت کرده‌اند. نتایج به دست آمده در اکثر تحقیقات نشانگر آن است که پرستاران دارای شیفت ثابت، وضعیت تغذیه‌ای و سلامتی بهتری نسبت به پرستاران سایر شیفت‌ها دارند، پرستاری از جمله مشاغلی است که لزوم کار به صورت ۲۴ ساعته و بهویژه کار در نوبت شب را ایجاب می‌نماید. کار کردن در شب برخلاف ساعت بیولوژیک بدن است و می‌تواند باعث اختلال در عملکرد خانوادگی و اجتماعی فرد و نیز کاهش کیفیت و کمیت خواب، خستگی زیاد، اضطراب، افسردگی و عوارض جسمی دیگر گردد (۶، ۱۲، ۱۸، ۲۱). در این پژوهش مشخص گردید نمره سلامتی پرستاران غیر سیگاری بالاتر از افراد سیگاری است و این دو متغیر تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. این نتیجه در اکثر تحقیقات مورد تائید قرار گرفته است. بیشتر از ۹۰ درصد پرستاران مورد مطالعه در این پژوهش سیگار نمی‌کشیدند که این نشان‌دهنده فرهنگ حاکم بر کشورمان و مؤثر بودن تبلیغات در جامعه در مورد عدم مصرف سیگار است و اینکه آموزش‌های داده شده در این مورد بسیار تأثیرگذار بوده است و قشر تحصیل کرده در این مورد بسیار خوب عمل کرده است (۴).

### نتیجه‌گیری

در کل می‌توان گفت یافته‌های بررسی، نشان‌دهنده این است که پرستاران مورد پژوهش در انجام و دریافت نمره کل رفتارهای سلامتی

در این پژوهش مشخص گردید سن با نمره سلامتی تفاوت معنادار داشته و با افزایش سن، نمره سلامتی پرستاران کاهش یافته است. این داده با نتیجه کسب شده در پژوهش‌های غفاری نژاد، درویش پور کاچکی، مظلومی محمود‌آباد هم‌خوانی دارد، به نظر می‌رسد با افزایش سن، آمادگی جسمانی و سلامت فرد کاهش می‌یابد و عموماً بیماری‌ها و مسائلی مانند فشارخون، دیابت و سایر بیماری‌های مزمن بهویژه بیماری‌های عضلانی - اسکلتی شیوع بیشتری پیدا می‌کند (۸، ۱۷، ۱۸). ولی برخی پژوهش‌ها نتیجه عکس پژوهش حاضر را گرفتند، آن‌ها معتقدند اگرچه انتظار می‌رود که با افزایش سن و سنتوات خدمت در حرفه پرستاری و عوامل استرس‌زا در شغلی، سلامت عمومی پرستاران کاهش یابد ولی پرستاران باسابقه و سن بیشتر دارای سلامت عمومی بهتری بودند. این موضوع احتمالاً به دلیل سازگار شدن آن‌ها با شرایط حرفه‌ای و پذیرش عوامل تنفس‌زاست که باعث شده احساس رضایت بیشتر و سلامتی عمومی بهتری داشته باشند (۴، ۶، ۱۲، ۱۴).

نتایج پژوهش نشان داد علی‌رغم اینکه شاخص توده بدنی زنان از مردان بالاتر بود ولی نمره سلامتی بالاتری نسبت به مردان دریافت کردند، لازم به یادآوری است میانگین BMI پرستاران مورد پژوهش ۲۴/۴۸ بوده که در دسته‌بندی طبیعی و بدون اضافه‌وزن قرار می‌گیرند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت پرستاران مورد پژوهش به عنوان افراد سالم از نظر BMI محسوب می‌شوند که با نتایج پژوهش مظلومی محمود‌آباد هم‌خوانی دارد (۸). این نتیجه می‌تواند بیانگر آن باشد که پرستاران برخلاف دارا بودن شاخص توده بدنی بالاتر ولی در بقیه ۶ حیطه رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت نمره بالاتری گرفته‌اند و در مجموع سالم‌تر به نظر می‌رسند. به عنوان مثال نمره رشد معنوی زنان از مردان بالاتر بوده و شیفت‌های متعدد مانند مردان نمی‌دادند و سیگار نیز کمتر مصرف می‌کردند. در این پژوهش نشان داده شد افراد متأهل نسبت به افراد مجرد و مطلقه نمره سلامتی بالاتری دریافت کرده‌اند و ارتباط این دو متغیر معنادار می‌باشد، این نتیجه با مطالعات مدانلو، کیراگ (Kirag) و بسر (Besar) کاملاً هم‌خوانی دارد چنان‌چه در پژوهش‌های مختلف، نشان داده شده که ازدواج و تشکیل خانواده و احساس حمایت از طرف اعضای خانواده موجب احساس شادکامی و سلامتی جسمی

شد شاخص توده بدنی زنان از مردان بسیار بالاتر بوده است، این نتیجه می‌تواند بیانگر آن باشد پرستاران زن از نظر سلامت عمومی در آینده، در معرض خطرات احتمالی از نظر عوارض اضافه وزن می‌باشند لازم است که در جهت روش‌های حفظ سلامت و کاهش وزن برنامه‌ریزی مدونی انجام گردد و حداقل سالی یکبار از نظر شاخص BMI کنترل شوند.

### تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب با شماره ثبت ۵۹۲۱۳۵ در تاریخ ۹۲/۱۱/۷ در دانشگاه علوم پزشکی آجا می‌باشد. پژوهشگران، از مسئولین و معاونت محترم پژوهش دانشکده پرستاری و کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آجا، مسئولین کتابخانه دانشکده پرستاری و کلیه همکاران گرامی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های منتخب نظامی واقع در شهر تهران که علی‌رغم مشغله فراوان در این پژوهش شرکت نموده و ما را در اجرای آن یاری نمودند، صمیمانه تشکر می‌نمایند.

در سطح قبل قبولی قرار دارند. با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهاد می‌شود از دادن شیفت‌هایی مانند صبح - عصر و شب - صبح به پرستاران خودداری شود چراکه در طولانی مدت تأثیرات عمیقی بر سلامت آن‌ها می‌گذارد، همچنین به منظور ارتقا سطح سلامت پرستاران و ایجاد رفتارهای سلامتی در حد عالی پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی سبک زندگی و رفتارهای سلامتی برگزار شود تا سطح کیفیت مراقبت از بیماران نیز بهبود یابد و نیز با توجه به پایین بودن سطح فعالیت فیزیکی در پرستاران، لزوم اجرای برنامه‌های آموزش سلامت با تأکید بر فعالیت فیزیکی در بین آن‌ها ضروری می‌باشد. لذا نیاز به برنامه‌ریزی مدون و جامعی در جهت ارتقاء میزان فعالیت‌های فیزیکی پرستاران لازم می‌باشد. در این مطالعه مشخص شد ۸۰ درصد پرستاران مورد تحقیق سالی یک‌بار از نظر سلامت عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده دقیق مطالعه نشان داد که ۲۰ درصد پرستاران مورد بررسی سالانه نتایج مطالعه نگرفته‌اند، لذا پیشنهاد می‌شود در مورد دلیل یا دلایل عدم معاینه این گروه مطالعه‌ای انجام شود. در این پژوهش مشخص

## References

- 1- Wittayapun Y, Tanasirug V, Butsripoom B, Ekpanyaskul Ch. Factors Affecting Health-promoting Behaviors in Nursing Students of the Faculty of Nursing Srinakharinwirot University. J Public Health. 2010; 40 (2): 215-225.
- 2- Chamroonsawasdi K, Pholphoklang S, Nanthamongkolchai S, Munsawaengsub CH. Factors Influencing Health Promoting Behaviors among the Elderly Under the Universal Coverage Program, Buriram Province, Thailand. Asia Journal of Public Health. 2010; 1 (1): 15-19.
- 3- Paradise M. Health Workforce Australia. Australia's Health Workforce Series Nurses in focus. Australia's Health Workforce Series. 2013; 1-48.
- 4- Motlagh Z, Mazloomy-Mahmoodabad S, Momayyezi M. Study of Health-promotion behaviors among university of medical science students. ZJRMS.2010; 13: 29-33 (Persian).
- 5- Habibi S, Nikpoor S, Syedalshuhday M, Haqqani H. Investigation of health-promoting behaviours and quality of life in elderly. J Ardabil Univ Med Sci. 2008; 8 (1): 29-36 (Persian)
- 6- Edrisi M, Khademloo M, Ghorban F. Self report of health promoting behaviors of nurses working in the educational hospitals. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 23 (105): 52-59. (Persian)
- 7- Hosseini M, Ashktorab T, Taghdisi MH. Health Promotion Lifestyle in Nursing Students: A systematic review. Health Pro Manage. 2012; 2 (1): 66-79. (Persian)
- 8- Mazloomi Mhamoodabad S, Fazelpour Sh, Askarshahi M. Health-Promoting Behaviors and Psychosocial Well-Being of University Shahid Sadoqi Yazd Academic Staff in Iran. J Ilam Univ Med Sci. 2013; 21 (3): 12-51. (Persian)
- 9- Karimi M, Eshrat B. Effect of Health Promotion Model based on physical activity in students. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012; 16 (3): 192-200. (Persian)
- 10- Mansorian M, Qorbani M, Solaimani MA. A Survey of Lifestyle and It's Influential Factors Among The University Students Gorgan. J Jahrom Univ Med Sci. 2009; 7 (1): 62-71. (Persian)
- 11- KemppianeuV. Nurses'roles in health promotion practice: an integrative review. Health promotion international. 4th ed, Finland; 2013. P.1-12.
- 12- Hojati H, Taheri N, Sharifnia H. Study of Mental and physical health of nurses working in hospitals of Golestan University of Medical Sciences. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2010; 8 (3): 144-149. (Persian)
- 13- Motaghi M, Basirimoghadam M, Rohani Z, Basirimoghadam K, Irani H. The Survey of Prevalence of Vertebral Column Pain and

- Some Related Factors in Nurses Employed in Gonabad Hospitals. Ofogh-e-Danesh. 2011; 17 (4): 51-57. (Persian)
- 14- Modanloo S, Bagheri Nesami M, Khalili R, Araghiyan F, Ismaili M. Survey of relationship between public health and demographic factors associated with it, in nurses. Second Global Conference on Health Promotion Strategies and Challenges; Tehran.2011. P.70. (Persian)
- 15- Meihan L, Ngok CH. Validation of the psychometric properties of the health-promoting lifestyle profile in a sample of Taiwanese women. Qual Life Res. 2011; 20: 523–528.
- 16- Arbabisarjou A, Ajdari Z, Omedi KH. Relationship between health promotion life style and life quality among nursing students. World of Sciences Journal. 2013; 2: 142-147.
- 17- Ghafari nejad A, Pooya F. Investigation of health promotion behaviors' in teachers at kerman. J Guilan Univ Med Sci. 2005; 11 (43): 1-11. (Persian)
- 18- Darvishpoor Kakhki A, Ebrahimi H, Alavi Majd H. Health Status of Nurses of Hospitals Dependent to Shahroud Medical University. Iran J Nurs. 2010; 22 (60): 19-27. (Persian)
- 19- McElligott D, Leask Capitulo K, Lynn Morris D. The Effect of a Holistic Program on Health-Promoting Behaviors in Hospital Registered Nurses. JHN. 2010; 20 (10): 1-9.
- 20- Kirag N, Ocaktan, E. Analysis of health promoting lifestyle behaviors and associated factors among nurses at a university hospital in Turkey. Saudi Med J. 2013; 34 (10): 1062-1067.
- 21- Beser A, Bahar Z, Buyukaya D. Health Promoting Behaviors and Factors related to Lifestyle among Turkish Workers and Occupational Health Nurses' Responsibilities in their Health Promoting Activities. Industrial Health. 2007; 45: 151–159.
- 22- Hoffman AJ, Scott LD. Role stress and career satisfaction among registered nurses by work shift patterns. JNA. 2003; 33: 337-342.

# Health-promoting behaviours and related factors among nurses in selected military hospitals

Kalroozi. F<sup>1</sup>, \*Pishgoorie. S A<sup>2</sup>, Taheriyani. A<sup>3</sup>, Khayat. S<sup>4</sup>, Faraz. R<sup>5</sup>

## Abstract

**Introduction:** health promoting behaviors are one of the main criteria for determining human health and the way to achieve a better quality of life. The aim of this study was to evaluate the status of health-promoting behaviours and related factors among nurses in selected military hospitals.

**Material and methods:** This research was a cross-correlation study that carried out on 400 clinical nurses working in AJA hospitals in Tehran. The subjects were recruited by multi-stages random sampling method. Data was collected by using international health promoting behaviours (HPLP-II) questionnaire, and then analyzed through descriptive and analytical statistics by SPSS software (version 21).

**Results:** 93.8% of nurses did not smoke. Average rate of health nurses score older than 45 years was  $113.2 \pm 2.41$ . that was the lowest score among the age groups. They had BMI  $24.48 \pm 4.1$ . At least once a year, 80% of them were aware of their health status. But among them, the highest percentage (19.5%) of reported illnesses related to musculoskeletal disorders (low back pain and foot). the lowest mean score in physical activity is obtained ( $13.88 \pm 4.53$ ). one-way ANOVA test was used to investigate the differences between the marital status and different shifts. The T test showed significant differences between smokers and non-smokers' health scores. Mean of total health-promoting behaviours was  $133.79 \pm 18.55$ . ANOVA test did not show significant difference in mean health -promoting behaviours in terms of the variable domains of the degree and type of ward.

**Discussion & Conclusion:** The mean score of health-promoting behaviors among nurses in this study indicate that their exposure is at acceptable level. The need for health education programmes with an emphasis on physical activity among them is essential.

**Keywords:** Health-promoting behaviors, nurses, health

1- Instructor, Iran, Tehran, AJA University of Medical Sciences, Faculty of Nursing, Department of Medical- Surgical

2- (\*Corresponding Author) Assistant Professor, Iran, Tehran, AJA University of Medical Sciences, Faculty of Nursing, Department of Medical-Surgical. E-mail: apishgoorie@yahoo.com

3- Student of Nursing, Iran, Tehran, AJA University of Medical Sciences, Faculty of Nursing

4- Student of Radiology, Iran, Tehran, AJA University of Medical Sciences, Faculty of Paramedical Science

5- BS. Iran, Shiraz, 576 Hospital